

ได้รับวัคซีนป้องกันโรค บริจาคโลหิตได้หรือไม่

วัคซีนป้องกัน

- พิษสุนัขบ้า
- บาดทะยัก



หลังฉีดวัคซีน 24 ชั่วโมง

ไม่มีอาการข้างเคียงจากการฉีดยา เช่น มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว
อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หรือมีผื่นแพ้ และบาดแผลหายดีแล้ว

✓ บริจาคโลหิตได้

วัคซีนป้องกัน ไวรัสตับอักเสบบี


กรณีที่ดีเพื่อป้องกัน หลังฉีดวัคซีน 21 วัน

✓ บริจาคโลหิตได้

กรณีที่ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรค

✗ เว้นการบริจาคโลหิต 1 ปี

วัคซีนป้องกัน โรคหัด โรคคางทูม หัดเยอรมัน โรคอีสุกอีใส และงูสวัด



หลังฉีดวัคซีน 4 สัปดาห์

ไม่มีอาการข้างเคียง เช่น มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หรือมีผื่นแพ้

✓ บริจาคโลหิตได้

วัคซีนป้องกัน โรคเมะเร็งปากมดลูก โรคไข้วัดใหญ่ ปอดอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบบี เอ

หลังฉีดวัคซีน 24 ชั่วโมง

ไม่มีอาการข้างเคียงจากการฉีดยา เช่น มีไข้
ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หรือมีผื่นแพ้

✓ บริจาคโลหิตได้

วัคซีนป้องกัน COVID-19

กรณีฉีดวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการรับรองจาก อย.

✗ เว้น 7 วัน หลังฉีด

✓ บริจาคโลหิตได้

กรณีมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ขอให้หายดีก่อน

✗ เว้น 7-14 วัน

ตามความรุนแรงของอาการ

*หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของ COVID-19

“โปรดตอบคำถาม
เกี่ยวกับสุขภาพ
ตามความเป็นจริง
เพื่อความปลอดภัย
ทั้งผู้ให้และผู้รับ”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ก.อ.รังสิต รังสิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ โทร. 0 2256-4300, 0 2263-9600-99 ต่อ 1101, 1760, 1761

www.blooddonationthai.com

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย

@nbctrc

@GiveBloodThai

Nationalbloodcentralthai

Blood Donation Thai

พิมพ์ สิงหาคม 2564

