

## โรคลัมปี สกินที่กำลังระบาดอยู่ในัวไทยตอนนี้ อันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่?

- ว่าติดโรคระบาด "ลัมปี สกิน" ลัมป่วยแล้วกว่า 60 ตัว เตรียมประก  
าศเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

### รู้จัก “โรคลัมปี สกิน” โรคระบาดในัว

โรคลัมปี สกิน เป็นโรคอุบัติใหม่ในโคกระบือ  
พบระบาดจากประเทศเพื่อนบ้าน มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy  
skin disease virus เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค กระบือ  
ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สูคน อัตราการป่วยมากกว่า 5%  
โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ก่อโรคตามอวัยวะที่มีเซลล์เยื่อ  
พบตุ่มเนื้องบนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย  
ซึ่งต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม  
สัตว์อาจมีไข้และหายใจลำบากร่วมด้วย โดยในโคนมอาจพบน้ำนมลดลง  
25-65%

### พาหะนำโรคลัมปี สกิน

โรคลัมปี สกิน มีแมลงดูดเลือดเช่น เห็บ แมลงวันดูดเลือด  
และยุงเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อ  
นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง  
ผ่านทางน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ที่เป็นโรค หรือผ่านทางรกได้

### อาการของโรคลัมปี สกิน

สัตว์ที่ติดเชื้อมีไข้สูง ต่อม่าน้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่ ประมาณ  
2-5 เซนติเมตร ขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย พบมากที่สุดที่คอ หัว เต้านม

ถุงอันตรายและหว่างขา ตุ่มที่ขึ้นอาจแตก ตกสะเก็ดและเกิดเป็นเนื้อตาย  
หรือมีหนองแมลงมาไชได้ อาจพบตุ่มน้ำใสขึ้นที่เยื่อเมือก  
ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ทำให้มีอาการน้ำลายไหล ตาอักเสบ  
มีตุ่มขึ้นที่เยื่อเมือก อัตราการป่วยอยู่ที่ 5-45 % อัตราการตายน้อยกว่า  
10% แต่อาจมีอัตราการตายสูงในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน  
ผลกระทบส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลผลิตที่ลดลง

## มนุษย์ติดโรคลัมปี สกินจากวัวได้หรือไม่?

โรคลัมปี สกิน เป็นโรคติดต่อในโค กระบือ  
แต่ไม่ติดต่อสูคนและสัตว์ชนิดอื่น เหมือนกับโรคฝีดาษ-สุกร  
เกิดโรคเฉพาะในสุกร ไม่ติดต่อสูสัตว์ชนิดอื่น และไม่ติดต่อสูคนเช่นกัน  
แต่ไม่แนะนำให้กินเนื้อวัวที่ป่วยเป็นโรค  
ควรบริโภคเนื้อวัวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยจ  
ากรมปศุสัตว์เท่านั้น

นอกจากนี้ การบริโภคเนื้อสัตว์จึงต้องรับประทานสุกทุกกรณี  
เพื่อหลีกเลี่ยงโรคบางโรคที่เกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์สุกๆดิบๆ เช่น  
โรคท้องร่วง หรือ โรคหูดับ (*Streptococcus suis*)

## การป้องกันโรคลัมปี สกินในวัว

1. กำจัดแมลงพาหะนำโรค ด้วยการใส่สารเคมีกำจัดแมลงแบบฉีด แบบ  
บราดหลัง หรือแบบฉีดพ่น
2. สำหรับสัตว์ทุกตัวในฝูง ปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มให้โปร่งโล่ง ไม่ใ  
ห้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ
3. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

4. กำจัดมูลสัตว์ออกจากฟาร์มเป็นประจำหรือใช้ผ้าใบคลุมเพื่อป้องกันแมลงมาวางไข่
5. กางมุ้งให้แก่สัตว์เพื่อป้องกันแมลงดูดเลือด

ทั้งนี้ หากเกษตรกรพบโค กระบือป่วยและแสดงอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ทันที หรือ call center 063-2256888 เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคเร็วที่สุด